



COMITÉ UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS CUVEDEIC



Tratamiento

- Antitoxina diftérica
- Antibióticos

Los Contactos deben recibir **tratamiento profiláctico**

Los contactos son aquellas personas que estuvieron a un metro o menos de distancia del enfermo



Recomendaciones

- Si no está vacunado, vacúnese
- Si tienes algunos de estos síntomas acude al médico inmediatamente
- Si tienes síntomas usa un tapabocas y mantente aislado para evitar contagio a la comunidad, solo debes acudir al médico.
- Si tienes placas en las amígdalas, no retirarlas
- Lavado de manos frecuente
- Uso de gel antibacteriano
- Tomar en vasos de plástico, no reusables
- Evitar contacto en el saludo
- Estornudo de etiqueta (estornudar y colocar su boca en el codo).
- Usar toallas desechables si tiene secreción nasal o tos productiva y botar después de usar

DIFTERIA

La Difteria es una enfermedad Bacteriana aguda, severa, causada por una toxina de una bacteria llamada *Corynebacterium diphtheriae*

Afecta principalmente el tracto respiratorio superior : amígdalas, faringe, laringe fosas nasales




COMITÉ UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS

DIFTERIA

Síntomas:

- Fiebre
- Tos seca y disfonía
- Dolor de garganta
- Debilidad generalizada
- Membrana blanco- grisáseo en amígdalas y faringe
- Edema en cuello
- Dificultad para respirar
- Lesiones en piel



Cómo se transmite?:

De persona a persona, a través de gotas de saliva al hablar o estornudar. (aquellos que se encuentren en una distancia de 1 metro o menos de la persona enferma).



Complicaciones:

Respiratorias
Cardiacas
Neurológicas
Muerte

Prevención:

Mediante la **VACUNACIÓN**.

- Todas las personas deben vacunarse
- Es una enfermedad prevenible por vacunas

Triple/Pentavalente:

Niños menores de 7 años con 3 dosis y 2 refuerzos (2,4, 6 meses, un refuerzo a los 18 meses y otro a los 5 años, luego DT a los 15 años y un refuerzo cada 10 años)

Toxide Diftérico:

Niños mayores de 7 años sin refuerzo
Adolescentes, embarazadas, adultos y 3era edad

